RIESGO QUIRUGICO DEL SAOS

HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA
Dr. Muñoz Colado

MORBIMORTALIDAD PERIOPERATORIA

- Esclamado (Laringoscope.1989)
  - 135 pacientes ... Complicaciones 13 %
  - HARMON .1989 .....(132 pacientes)
    - 26 % complicaciones 2 Muertes..
  - FAIRBANKS.1990.
    - 16 Muertes 7 complicaciones graves

ESTUDIO PREOPERATORIO

- **VALORAR**

- OBESIDAD
- TIPO DE CUELLO
- INFORME ORL
- ESTUDIO CARDIACO
- ESTUDIO GASOMETRICO
- EXP. FUNCIONAL RESPIRATORIA
- POLISOMNOGRAFIA

RECOMENDACIONES PREQUIRURGICAS

- IAH > 40
- SM<80 %. CPAP 2 semanas antes
- No fumar 15 dias antes
- Adelgazar
- No sedantes

DIFICULTADES ANESTESICAS

- Problemas de transporte
- Mesa de quirófano
- Medicion dificultosa T.A.
- Dificil de canalizar vias
- Intubaciones dificultosas
- Desaturaciones frecuentes

MEDIDAS EN QUIROFANO

- No anestesiar sin Cirujano presente
- Intubar por anestesista competente
- Tener mascarilla laringea preparada
- Tener Fibroscopio
- No sedar excesivamente
- No relajantes potentes

RECOMENDACIONES POSTCIRUGIA

- CORTICOIDES SISTEMICOS
- POSICIÓN SEMISENTADO
- OXIMETRIA NOCTURNA
- CPAP EN PRIMERA NOCHE
- NO SEDANTES
- ANALGESICOS NO OPIACEOS