

SORDERA SÚBITA

Protocolo consensuado por
AMORL

Dr. M. Muñoz Colado

DEFINICIÓN

- Se define como una pérdida auditiva de carácter neurosensorial que afecta a tres o más frecuencias consecutivas y que aparece de forma brusca o máximo en un plazo de 72 horas

CAUSAS

(J. Herrero-Agustin,et al)

- 1.- INFECCIONES

- VIRICAS

- LABERINTITIS
- NEURONITIS
- MENINGOENCEFALITIS
- POLINEUROPATIAS
- VIRICA SESPECIFICAS(Citomegalovirus. Rubeola)
- HERPES , VIH

- BACTERIANAS

- MENINGITIS
- SIFILIS
- BORRELIOSIS
- PSITACOSIS.

CAUSAS

- **2. VASCULARES**

- A. Obstructivas

- Síndrome de hiperviscosidad
- Obstrucción de pequeño vaso
- Microangiopatías
- Vasoespasmos
- Tromboembolismos

- B. Hemorragias intralaberínticas

CAUSAS

- 3 ROTURA DE MEMBRANAS
 - A. Rotura membrana de Reissner
 - B. Rotura membrana oval o redonda
 - Traumatismo craneal
 - Barotrauma
 - Malformaciones
 - Pst cirugía otoesclerosis

CAUSAS

- 4 SORDERA INMUNOMEDIADA
 - ENFERMEDADES AUTOINMUNES
 - CONECTIVOPATIAS
 - LUPUS ERITEMATOSO
 - POLICONDRITIS RECIDIVANTE
 - PANARTERITIS NODOSA
 - SINDROME DE COGAN
 - COLITIS ULCEROSA
 - ENFERMEDAD DE CHRON

CAUSAS

- **5 ENFERMEDADES NEUROLOGICAS**

- Migrañas
- Esclerosis Múltiple

- **6 NEOPLASIAS**

- Neurinoma del acústico
- Histiocitosis
- Metastasis

- **7 OTOTOXICIDAD**

METODOS DIAGNÓSTICOS

- HISTORIA CLÍNICA
- EVOLUCIÓN OTONEUROLÓGICA
- OTOSCOPIA. TEST DE LA FISTULA
- ACUMETRIA
- AUDIOMETRIA TONAL
- ANALITICA COMPLETA
- RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CEREBRAL
- POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS
- ESTUDIO FUNCION TIROIDEA / FTA. ABS- VDRL- INMUNOFENOTIPO- ANA- ANCA- SEROLOGIAS VIRALES

TRATAMIENTO

- Tratamiento Hospitalario 72 horas
- ELOHES O VOLUVEN (hidroximetil-almidón 6%)
 - 1000 cc a pasar en 6 horas
- Urbason soluble 40 mg cada 12 horas (metil prednisolona)
- 500 microgramos de vit. B12
- Pentoxifilina intravenoso 300 mg / 12 horas (en el suero)
- Este tratamiento se mantendrá tres días en régimen de hospitalización
- Audiometrias diarias

TRATAMIENTO AMBULATORIO

- Metil prednisolona 1 mg/kg/día
 - en pauta descendente
- Nimodipino 30 mg / 8 horas
- Controles audiométricos cada 15 días